

Informe SatiQ

| Min. Estadía: 1 | | | Estadía Media: 9.34 | | Modo Estadía: 1.00 | | Mediana Estadía: 4.00 | | Des v. Estandar : 15.88 | |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|
| Mortalidad en U | TI : 189 | 9.85 | % | | | | Mortalida | d Esperada | : 8.27 % | (RME: 1.19) |
| | | | | | | | | | TOTA | AL % |
| Episodios con | escaras | 3 | | | | | | | 15 | 0.78 |
| Pacientes con | | | | | | | 158 | 8.24 | | |
| Pacientes con ARM y VI | | | | | | | | 735 | 38.32 | |
| Episodios con neumonía asociada a ARM | | | | | | | | 105 | 5 14.29 | |
| Pacientes con cateter | | | | | | | | | 742 | 38.69 |
| Episodios con infecciones asociadas a cateter | | | | | | | | | 33 | 4.45 |
| Pacientes con sonda foley | | | | | | | | | 922 | 48.07 |
| Episodios con infección urinaria asoc. a sonda foley | | | | | | | | | 63 | 6.83 |
| Episodios con deslizamientos no prog. de la cama | | | | | | | | | 1 | 0.05 |
| Reingresos | | | | | | | | | 21 | 1.09 |
| Pacientes del Sexo Femenino | | | | | | | | 800 | 41.71 | |
| Pacientes del | Sexo Ma | asculino | | | | | | | 111 | 8 58.29 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Modo | Mediana | Total | % | Mínimo | Máximo | Media | SD |
| PIM | | | -4.88 | -4.16 | | | -7.39 | 52.37 | -3.36 | 2.55 |
| | | | (1.00 %) | (1.54 %) | | | (0.06 %) | (100.00 %) | (8.27 %) | (18.02 %) |
| PRISM | | | 5.00 | 10.00 | | | 1.00 | 43.00 | 11.50 | 7.74 |
| | | | (4.18 %) | (5.56 %) | | | (0.58 %) | (97.76 %) | (13.74 %) | (19.80 %) |
| TISS | | | 21.00 | 21.00 | | | 2.00 | 58.00 | 21.87 | 8.14 |
| Edad | | | 2.00 | 28.00 | | | 1.00 | 258.00 | 59.60 | 63.61 |
| Días Cama de ARM y VI | Pacien | tes con | 1.00 | 5.00 | 9567.71 | 53.43 | 0.04 | 248.00 | 10.54 | 19.71 |
| Días Cama de ARM y VNI | Pacien | tes con | 1.00 | 2.77 | 749.78 | 4.19 | 0.02 | 40.00 | 4.04 | 5.49 |
| Días Cama de CVC | Pacien | tes con | 1.00 | 6.00 | 9148.00 | 51.09 | 1.00 | 367.00 | 7.70 | 12.39 |
| Días Cama de SF | Pacien | tes con | 1.00 | 4.00 | 6502.00 | 36.31 | 1.00 | 411.00 | 7.55 | 16.34 |
| Incidencia de N | leumon | ía Asoci | ada a AF | RM (y VI) c | :/1000 día | as | | | | 12.91 |
| Incidencia de li | | | | | | | | | | 3.78 |
| Incidencia de Infección Urinaria c/1000 días 8.98 | | | | | | | | | | |